

Iratkozzon fel egy
15000 Ft-os ajánlatra

[Próbálja ki az Adwords-öt](#)

Lehet, hogy leukémiás a gyermekem?

Kárpátinfo.net | 03/20/2013 - 20:30 | Utolsó módosítás: 03/20/2013 - 20:40 | [Életmód](#)

 Tetszik 0  +1 0  Megosztás  Tweet 0  SHARE

Nincs rosszabb, mint amikor az ember gyermeke betegszik meg.

Onkológus magánrendelés

Mutacio.hu/onkologus-maganrendeles

Tanácsot és információkat adunk a betegségről, kezelési lehetőségről.



AdChoices 

Hasonló cikkek

- [Leukémiával kezelik Karl Erik Böhnt](#)
- [HIV vírussal a leukémia ellen](#)
- [A kétéves kis Charlie kísérte oltárhoz a szüleit - Halálos beteg](#)
- [Az egész NB I összefog a leukémiás diósgyőri kapusért](#)
- [Teremtornát rendeznek a Diósgyőr leukémiás kapusának megsegítésére](#)

Lézeres szemműtét
az elérhető legmodernebb technikával. Kattintson ingyenes vizsgálatért!
www.focusmed.hu

[Hirdessen itt!](#)

Ilyenkor egy szülő mindent megtenne azért, hogy minél hamarabb diagnosztizálják és meggyógyítsák szeretett szeme fényét. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy időben orvoshoz forduljunk!

A leukémiás gyerekeknél fellépő tünetek egyike sem tipikusan jellemző a leukémiára. Ahhoz, hogy megállapítsák, hogy valóban leukémia áll-e a panaszok hátterében, igen alapos kivizsgálására van szükség.

A leukémia tünete lehet a vérszegénység. Ez a vörösvértestek elégtelen termelődésének következménye, ilyenkor a gyermek sápadt, fáradékony, légzése felgyorsulhat. További jel lehet a vérzések, véraláfutások kialakulása a gyermek testén, ami a vérlemezkék elégtelen termelődésének következménye. A bőrön minimális erőbehatásra is véraláfutások jelennek meg, gyakoriak a spontán nyálkahártya-vérzések (pl. orrban, szájban).

Fokozottan figyeljünk, ha a gyermek nem tudja leküzdeni a fertőzéseket. A leukémia diagnózisának felállításával egy időben gyakran észlelhető tünet a felső légúti hurutos megbetegedés, de ezen kívül a mandulagyulladásból a szájfekélyen és a hasmenésen át egészen az életveszélyes tüdőgyulladásig, számos fertőzőes tünet is felléphet. Jelentkezhetnek csont- és ízületi fájdalmak, ami a csontvelő „érintettségének” a következménye. Jellemző még a hasi fájdalom: a leukémiás sejtek gyakran összegyűlnek a vesében, a májban vagy a lépben, aminek következtében ezek a szervek megnagyobbodnak, s ez hasi fájdalommal jár. A nyirokcsomókban is felhalmozódhatnak a kóros sejtek, így azok megduzzadhatnak. Egyes leukémiás gyerekeknél a leukémia jelei között lehetnek a hányinger, láz, megfűlés, éjjeli verejtékezés, kimerültség és más influenzaszerű tünetek.

Nem kell azonban rögtön megijedni, ha ehhez hasonló tüneteket tapasztalunk- mondja dr. Harmat György, a Heim Pál Gyermekkórház volt főigazgatója, az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány orvosszakértője. Biztosat mondani csak szakorvos tud a részletes vizsgálatok után. De fontos, ha felmerülnek a tünetek, mielőbb forduljunk szakemberhez, mivel a gyógyulás esélye a korai diagnózis esetén sokkal jobb. Ma már több mint 75%-ban gyógyítható ez a súlyos betegség.

Forrás: Napidoktor.hu