

## ROVATOK

### Hírek

Lapszemle  
Regionális hírek  
Egészségpolitika  
Egészségmagazin  
Gyógyszerpiac  
Kórházak - ügyek  
Veseelégtelenség  
Psoriasis  
Szervátültetés  
Omega-3

## SZAKMAI OLDALAK

Esetismertetések  
Gastroenterológiai klub  
Háziorvos klub  
Kardiológia klub  
Neurológia klub  
Nephrológia Klub  
Nőgyógyászat klub  
Ortopédia klub  
Osteoporosis klub  
Pszichiátriai klub  
Urológia klub

Dental Implants  
Fogászati implantátumok

Hallgassa  
az élő  
adást!



Hírek / Vissza a rovat főoldalára »

## Számos tünet a leukémia hátterében

**A korai diagnózis és jó gyógyulás esély érdekében minél előbb orvoshoz kell fordulni.**



A leukémiás gyerekeknél fellépő tünetek egyike sem tipikusan jellemző a leukémiára. Ahhoz, hogy megállapítsák, hogy valóban leukémia áll-e a panaszok hátterében, igen alapos kivizsgálásra van szükség.

HIRDETÉS



A leukémia tünete lehet a vérszegénység. Ez a vörösvértestek elégtelen termelődésének következménye, ilyenkor a gyermek sápadt, fáradékony, légzése felgyorsulhat. További jel lehet a vérzések, véraláfutások kialakulása a gyermek testén, ami a vérlemezkék elégtelen termelődésének következménye. A bőrön minimális erőbehatásra is véraláfutások jelennek meg, gyakoriak a spontán nyálkahártya-vérzések (pl. orrban, szájbán). Fokozottan figyeljünk, ha a gyermek nem tudja leküzdeni a fertőzéseket. A leukémia diagnózisának felállításával egy időben gyakran észlelhető tünet a felső légúti hurutos megbetegedés, de ezen kívül a mandulagyulladásról a szájfekélyen és a hasmenésen át egészen az életveszélyes tüdőgyulladásig, számos fertőzések tünet is felléphet. Jelenkezhetnek csont- és ízületi fájdalmak, ami a csontvelő „érintettségének” a következménye. Jellemző még a hasi fájdalom: a leukémiás sejtek gyakran összegyűlnek a vesében, a májban vagy a lépben, aminek következtében ezek a szervek megnagyobbodnak, s ez hasi fájdalommal jár. A nyirokcsomókban is felhalmozódhatnak a káros sejtek, így azok megduzzadhatnak. Egyes leukémiás gyerekeknél a leukémia jelei között lehetnek a hányinger, láz, megfűlés, éjjeli verejtékezés, kimerültség és más influenzaszerű tünetek.

Nem kell azonban rögtön megijedni, ha ehhez hasonló tüneteket tapasztalunk - mondja **dr. Harmat György**, a Heim Pál Gyermekkórház volt főigazgatója, az Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány orvosszakértője. Biztosat mondani csak szakorvos tud a részletes vizsgálatok után. De fontos, ha felmerülnek a tünetek, mielőbb forduljunk szakemberhez, mivel a gyógyulás esélye a korai diagnózis esetén sokkal jobb. Ma már több mint 75 százalékban gyógyítható ez a súlyos betegség.