

hirdetés ▾



„Mosolyogva..”

[Cikk nyomtatása](#) | [Hozzászólások \(0\)](#) | [Facebook](#) | [My](#) | [Google](#) | [Twitter](#) | [RSS](#) | [Több](#)

 2013. március 25. 15:00 | PP-Eletforma | kulcsszavak: [gyermek](#), [leukémia](#), [vérszegénység](#)

## ORVOS VÁLASZOL



### Lehet, hogy leukémiás a gyermeke?

**Nincs rosszabb, mint amikor az ember gyermeke betegszik meg. Ilyenkor egy szülő mindent megtenne azért, hogy minél hamarabb diagnosztizálják és meggyógyítsák szeretett szeme fényét. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy időben orvoshoz forduljunk!**

A leukémiás gyerekeknél fellépő tünetek egyike sem tipikusan jellemző a leukémiára. Ahhoz, hogy megállapítsák, valóban leukémia áll-e a panaszok háttérében, igen alapos kivizsgálására van szükség.

A leukémia tünete lehet a vérszegénység. Ez a vörsvértestek elégtelen termelődésének következménye, ilyenkor a gyermek sápadt, fáradékony, légzése felgyorsulhat. További jel lehet a vérzések, véraláfutások kialakulása a gyermek testén, ami a vérelemek elégtelen termelődésének a következménye. A bőrön minimális erőbehataásra is véraláfutások jelennek meg, gyakoriak a spontán nyálkahártyavérzések (pl. orrban, szájbán). Fokozottan figyeljünk, ha a gyermek nem tudja leküzdeni a fertőzéseket. A leukémia diagnózisának felállításával egy időben gyakran észlelhető tünet a felső légúti hurutos megbetegedés, de ezenkívül a mandulagyulladás a szájfekélyen és a hasmenésen át egészen az életveszélyes tüdőgyulladásig számos fertőzőes tünet is felléphet. Jelentkezhetnek csont- és ízületi fájdalmak, ami a csontvelő „érintettségének” a következménye. Jellemző még a hasi fájdalom: a leukémiás sejtek gyakran összegyűlnek a vesében, a májban vagy a lépben, aminek következtében ezek a szervek megnagyobbodnak, s ez hasi fájdalommal jár. A nyirokcsomókban is felhalmozódhatnak a kóros sejtek, így azok megduzzadhatnak. Egyes leukémiás gyerekeknél a leukémia jelei között lehetnek a hányinger, láz, meghűlés, éjjeli verejtékezés, kimerültség és más influenzaszerű tünetek.

Nem kell azonban rögtön megijedni, ha ehhez hasonló tüneteket tapasztalunk – mondja dr. Harmat György, a Heim Pál Gyermekkorház volt főigazgatója, az **Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány** orvosszakértője. Biztosat mondani csak szakorvos tud a részletes vizsgálatok után. De fontos, hogy ha felmerülnek a tünetek, mielőbb forduljunk szakemberhez, mivel a gyógyulás esélye korai diagnózis esetén sokkal jobb. Ma már több mint 75%-ban gyógyítható ez a súlyos betegség.

### Orvosi rendelő további cikkek...

- ▶ Minden szemölcs fertőző! Mit lehetünk ellenük?
- ▶ A rágás képessége csökkenti az elbutulást
- ▶ Mennyi D-vitaminra van szüksége egy gyereknek?
- ▶ Amit a méhen kívüli terhességről tudni kell...
- ▶ A menesz előtti tünetek enyhítése
- ▶ Túl erős a menstruációd? Lehet, hogy vérékeny vagy!

### További friss cikkek...

- ▶ Minden szemölcs fertőző! Mit lehetünk ellenük?
- ▶ Profi és tartós otthoni szűrőtelenítés – kivételek nélkül
- ▶ A rágás képessége csökkenti az elbutulást
- ▶ A tartós fogyás titka: az ayurvédikus diéta
- ▶ Külföldiek esküdnek Budapesten
- ▶ Lehet, hogy leukémiás a gyermeke?

### KONYHA & FÜRDŐ

**Konyha & Fürdő előfizetés akár 50%-kal olcsóbban**
**Print Konyha & Fürdő**  
**1.600 Ft / 4 lapszám**
**Digitális Konyha & Fürdő**  
**800 Ft / 4 lapszám**