


7 jel, ami leukémiára utalhat

Vigyázzunk gyermekeinkre!



Megjelent: 2013.03.26.

Partner: HaziPatika.com

Címkék: leukémia, vérszegénység, véraláfutás, felső légúti fertőzések, ajakfekély, csontfájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, dr. Harmat György

Nincs rosszabb, mint amikor az ember gyermeke betegszik meg, különösen, ha daganatos betegség áldozata lesz. Minden esetben elengedhetetlen a gyógyuláshoz, hogy időben orvoshoz forduljunk!

A leukémiás gyerekeknél fellépő tünetek egyike sem tipikusan jellemző a leukémiára. Ahhoz, hogy megállapítsák, hogy valóban leukémia áll-e a panaszok háttérében, igen alapos kivizsgálására van szükség.

- A leukémia tünete lehet a vérszegénység. Ez a vörösvértestek elégtelen termelésének következménye, ilyenkor a gyermek sápadt, fáradékony, légzése felgyorsulhat.
- További jel lehet a vérzések, véraláfutások kialakulása a gyermek testén, ami a vérlemezkék elégtelen termelésének a következménye. A bőrön minimális erőbehatásra is véraláfutások jelennek meg, gyakoriak a spontán nyálkahártya-vérzések (pl. orrban, szájban).
- Fokozottan figyeljünk, ha a gyermek nem tudja leküzdeni a fertőzéseket. A leukémia diagnózisának felállításával egy időben gyakran észlelhető tünet a felső légúti hurutos megbetegedés, de ezen kívül a mandulagyulladásról a szájfekélyen és a hasmenésen át egészen az életveszélyes tüdőgyulladásig, számos fertőzőes tünet is felléphet.
- Jelentkezhetnek csont- és ízületi fájdalmak, ami a csontvelő "érintettségének" a következménye.
- Jellemző még a hasi fájdalom: a leukémiás sejtek gyakran összegyűlnek a vesében, a májban vagy a lépben, aminek következtében ezek a szervek megnagyobbodnak, s ez hasi fájdalommal jár.
- A nyirokcsomókban is felhalmozódhatnak a kóros sejtek, így azok megduzzadhatnak.
- Egyes leukémiás gyerekeknél a leukémia jelei között lehetnek a hányinger, láz, meghűlés, éjjeli verejtékezés, kimerültség és más influenzaszerű tünetek.



Nem kell azonban rögtön megijedni, ha ehhez hasonló tüneteket tapasztalunk - mondja dr. Harmat György, a Heim Pál Gyermekkórház volt főigazgatója, az [Együtt a Leukémiás Gyermekekért Alapítvány](#) orvosszakértője. Biztosat mondani csak szakorvos tud a részletes vizsgálatok után. Fontos, ha felmerülnek a tünetek, mielőbb forduljunk szakemberhez, mivel a [gyógyulás esélye](#) a korai diagnózis esetén sokkal jobb. Ma már több mint 75 százalékban gyógyítható ez a súlyos betegség.